

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 99

DECEMBRE 1968

- 43 -

LES TRAITEMENTS D'HIVER DE LA VIGNE

Les traitements d'hiver deviennent de plus en plus nécessaires dans de nombreux vignobles. Ils permettent de combattre un grand nombre de maladies et de ravageurs.

Un certain nombre de maladies, telles que l'ESCA, l'ANTHRACNOSE, ne peuvent être combattues que par des traitements spécifiques. Par contre, de nombreux essais montrent l'efficacité des huiles d'Anthracène jaunes utilisées au début du gonflement des bourgeons (stade B) pour lutter contre l'EXCORIOSE, l'ACARIOSE, l'ERINOSE et même les COCHENILLES et le PHYLLOXERA gallicole.

ESCA -

Avant toute autre chose il convient d'éliminer les foyers d'infection en arrachant et en brûlant sur place les souches malades. Il est préconisé également d'éviter, dans la mesure du possible, les grosses plaies de taille qui peuvent être une porte d'entrée pour le champignon. Cependant, ces méthodes de lutte préventive ne sont pas suffisantes et, lorsqu'une vigne est attaquée par l'ESCA, les traitements chimiques sont indispensables.

Les traitements effectués l'hiver, après la taille et avant le débourrement, avec une solution d'arsénite de soude à la dose voulue pour qu'il y ait 1 250 g d'arsenic par hectolitre, donnent de bons résultats. La pulvérisation doit être abondante, appliquée pas trop près de la taille et pas trop tard pour éviter des brûlures, en utilisant un pulvérisateur à dos équipé d'une lance munie d'un interrupteur et d'un jet à cône étroit.

Les arsénites de soude sont des sels solubles et extrêmement toxiques. La loi en tolère l'utilisation uniquement pour les traitements d'hiver de la vigne. Il convient de prendre les plus grandes précautions pour le stockage, la manipulation et l'application de ces produits.

EXCORIOSE -

En dehors des mesures préventives qui consistent à choisir des plants sains, à aérer les vignes, à appliquer des fumures équilibrées, la lutte consiste essentiellement à détruire les formes de conservation hivernale de la maladie c'est-à-dire les pycnides. Le mycélium qui vit à l'intérieur des bourgeons de la base des sarments attaqués ne peut pas être détruit.

.../...

L'Arsénite de soude appliqué après la taille et avant le débourrement donne les meilleurs résultats. Toutefois, les autres formules conseillées : colorants nitrés à 0,5 %, huile d'Anthracène à 3 %, huile d'Anthracène jaune, une solution de Sulfate de fer (30 kgs de Sulfate de fer + 1 litre d'Acide Sulfurique pour 100 litres d'eau), sont également intéressantes.

ANTHRACNOSE -

Cette maladie s'observe dans certaines vignes d'hybrides producteurs directs. Elle se manifeste :

- sur les feuilles par de petites taches anguleuses, noires violacées, de 1 à 5 mm qui finissent par se dessécher et tomber en laissant un trou irrégulier ;
- sur les parties jeunes des rameaux par des taches allongées, creusées, grises au centre et cernées de noir ;
- sur les grappes par la dessiccation totale des grappes jeunes ou l'apparition de taches analogues à celles des rameaux sur des grappes plus âgées.

On peut combattre cette maladie en hiver en effectuant un traitement après la taille avec une solution contenant 30 à 35 kgs de Sulfate de fer et 2 litres d'Acide Sulfurique pour 100 litres d'eau. Toutefois cette formule ne peut pas être utilisée sur des vignes conduites sur fil de fer.

COCHENILLES -

Ces ravageurs provoquent l'apparition de la Fumagine sur les sarments. Pour les combattre on peut utiliser soit un Oéloparathion, soit une huile d'Anthracène.

Ces traitements doivent être effectués avant le débourrement. Les Oléoparathions sont contre-indiqués sur Gamay qui est sensible aux huiles blanches.

ACARIOSE -

Cette affection se rencontre dans certains vignobles. Des essais récents ont montré l'intérêt des huiles d'Anthracène jaunes.

On peut également utiliser juste avant le débourrement soit une bouillie Sulfocalcique à 4 ou 5 %, soit un Oléoparathion à la dose indiquée par le fabricant, soit un soufre micronisé à 2 %.

AVIS CONCERNANT LE REABONNEMENT

Nous demandons instamment à nos fidèles abonnés de renouveler leur abonnement avant le 15 Janvier 1969.

A partir de cette date nous ne serons plus en mesure d'envoyer les numéros déjà parus de la revue "Phytoma" et des Bulletins techniques dont la collection risque ainsi d'être incomplète.

Nous rappelons que les abonnements se terminent au 31 Décembre de chaque année quelle que soit la date du versement.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux,

G. BENAS